

AminexTM

Bioestimulante de Cultivos

BIOESTIMULANTE FOLIAR QUE CONTIENE NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO PARA LOS CULTIVOS ENUMERADOS.

ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
NO EXPONER A LA LUZ SOLAR.

Composición (%p/p):

Nitrogeno (N)	11%
Fósforo (P ₂ O ₅)	1.4%
Potasio (K ₂ O)	5.7%

Densidad relativa (al agua 20°C)	1.18 g/ml
Solubilidad en agua	100% @ 20°C
pH	8.3 @ 20°C

Metales Pesados:

Arsénico (As)	<0.5 mg/kg	Mercurio (Hg)	<0.5 mg/kg
Cadmio (Cd)	<0.5 mg/kg	Plomo (Pb)	<0.5 mg/kg

Volumen neto

20 L



Registrado/Importado y Distribuido por:

MBFi Chile SPA • RUT 77470193-1

Fecha inicio 9-11-21

Cerro el Plomo 5680 of 301PS 3 Null

Las Condes - Chile

Fabricado, suministrado y Origen:

MBFi (PTY) LTD - Sudáfrica • Reg No: 2013/211882/07

P.O. Box 1137, Delmas, Mpumalanga, 2210

Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711

Email: orders@mbfi.bio • Web: www.mbf.bio

AminexTM es una marca registrada de MBFi Chile SPA.

CHILE 001

PRODUCTIVIDAD

Aminex es un bioestimulante vegetal de base orgánica para cultivos que experimentan condiciones de estrés extremo debido a condiciones ambientales como sequía, exceso y déficit de humedad, cambios bruscos de temperatura debido a condiciones nubladas o ventosas. Aminex asegurará la continuación del crecimiento normal a pesar de estas condiciones de stress que afectan al cultivo.

CHILE 001

GUÍA GENERAL DE APLICACIÓN: Utilice sólo según las instrucciones

- Uso exclusivo como fertilizante. Agite bien antes de usar.
- Aminex es compatible con la mayoría de productos agrícolas como fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares. Sin embargo, es recomendable hacer una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo con otros productos químicos.
- Evite mezclar Aminex con productos a base de cobre, fertilizantes que contengan fosfatos, aceites, así como materiales altamente alcalinos como el caldo bordeles y el azufre de cal.
- Aplicar Aminex en cantidades adecuadas de agua para asegurar una cobertura completa del cultivo.
- Siga los procedimientos estándares de mezclado en el tanque.
- No aplicarlo de manera concentrada (diluir en agua según etiqueta).
- Consulte también con su agrónomo si se requieren cronogramas de cultivo específicos o cualquier otra información sobre el uso de Aminex, como recomendaciones basadas en análisis de plantas o suelos, así como la aplicación con drones y aviones.

Detalles de mezcla y aplicación: Aminex debe aplicarse preferentemente temprano en la mañana o al final de la tarde. La dosis de aplicación depende de la fertilidad del suelo y la reacción requerida.

Almacenamiento: Aminex debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones libres de heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de niños y animales. Evitar la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Cultivo	Dosis/100 L de agua	Dosis max/ha	Momento de aplicación
Almácigos	150 ml	250 ml	Aplicar 4 veces con intervalos de 10 días durante los períodos de estrés que impiden el crecimiento. Use la dosis de pulverización de mantenimiento para plántulas cultivadas en invernaderos y la dosis más alta para plántulas cultivadas en campo abierto.
Brassicaceas: Brócoli, Coles de Bruselas, Coliflor, Colinabo, Mostaza, Repollo	500 ml	3 L	Aplique en el trasplante, repita en la etapa de 4-6 hojas y repita cada 14-21 días según sea necesario.
Citrus: Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo	250-500 ml	2.5-5 L	Aplicar de 2-8 aplicaciones por temporada a partir de brotes de 5 cm, antes de la floración, durante la floración, cuajado, crecimiento y maduración del fruto. Agrandamiento y maduración de la fruta: Comience de 4-6 aplicaciones en intervalos de 7-21 días directamente después del cuajado de la fruta. También recomendado cuando se presentan situaciones de estrés durante el crecimiento vegetativo.
Cucurbitáceas: Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Zapallos	500 ml	3 L	Aplique en el trasplante, repita en la etapa de 4-6 hojas y repita cada 14-21 días según sea necesario.
Frutales de Carozo: Almendra, Cereza, Ciruela, Damasco, Durazno, Nectarín	250-500 ml	2.5-5 L	Aplicar de 2-8 aplicaciones por temporada a partir de brotes de 5 cm, antes de la floración, durante la floración, cuajado, crecimiento y maduración del fruto. Agrandamiento y maduración de la fruta: Comience de 4-6 aplicaciones en intervalos de 7-21 días directamente después del cuajado de la fruta. También recomendado cuando se presentan situaciones de estrés durante el crecimiento vegetativo.

Cultivo	Dosis/100 L de agua	Dosis max/ha	Momento de aplicación
Fruta de pepita: Manzana, Membrillo, Pera	250-500 ml	2.5-5 L	Aplicar de 2-8 aplicaciones por temporada a partir de brotes de 5 cm, antes de la floración, durante la floración, cuajado, crecimiento y maduración del fruto. Agrandamiento y maduración de la fruta: Comience de 4-6 aplicaciones en intervalos de 7-21 días directamente después del cuajado de la fruta. También recomendado cuando se presentan situaciones de estrés durante el crecimiento vegetativo.
Frutas subtropicales: Granada, Kiwi	250-500 ml	2.5-5 L	Aplicar de 2-8 aplicaciones por temporada a partir de brotes de 5 cm, antes de la floración, durante la floración, cuajado, crecimiento y maduración del fruto. Agrandamiento y maduración de la fruta: Comience de 4-6 aplicaciones en intervalos de 7-21 días directamente después del cuajado de la fruta. También recomendado cuando se presentan situaciones de estrés durante el crecimiento vegetativo.
Hortalizas de bulbo: Ajo, Cebolla, Ciboullete, Puerro	1 L	3 L	Comience la aplicación desde el inicio del bulbo y repita 3-4 veces a intervalos de 14-21 días.
Legumbres: Arvejas, Garbanzo, Lentejas, Mani, Porotos on vaina, Porotos secos, Porotos	500 ml	3 L	Aplicar en la floración y repetir en la formación de vainas 7-21 días después.
Oliva	250-500 ml	2.5-5 L	Aplicar de 2-8 aplicaciones por temporada a partir de brotes de 5 cm, antes de la floración, durante la floración, cuajado, crecimiento y maduración del fruto. Agrandamiento y maduración de la fruta: Comience de 4-6 aplicaciones en intervalos de 7-21 días directamente después del cuajado de la fruta. También recomendado cuando se presentan situaciones de estrés durante el crecimiento vegetativo.
Papa	500 ml	3 L	Iniciar la aplicación desde el inicio del tubérculo y repetir 3-4 veces en intervalos de 14-21 días.
Pimiento y Tomate	500 ml	3 L	Aplicar según sea necesario en períodos de estrés a intervalos de 7 días.
Uva de mesa y vid	250 ml	2.5-4 L	Comience la aplicación directamente después del cuajado; repita a intervalos de 7-10 días.