

Ferti-Aminomovens

BIOESTIMULANTE DE PLANTAS / LÍQUIDO EN SOLUCIÓN

Formulado en Planta de Economía Circular, *Ferti-AminoMovens* estimula y favorece el desarrollo radicular y vegetativo, aumenta la tasa de absorción de nutrientes con gran ahorro energético (nitrógeno metabolizado), aporte directo en la nutrición con Aminoácidos esenciales de tipo *levo-giros*, obtenidos gracias al proceso enzimático, generando fortalecimiento y recuperación de plantas con stress (térmicos, nutricionales, lumínicos o salinos). Optimo filtrado para uso seguro en sistema presurizados

COMPOSICIÓN

Aminoácidos Libres	11,97 g/100 g
Aminoácidos Totales	12,6 g/100 g
Nitrógeno Total	1,5 g/100 g
Nitrogeno Orgánico	1,49 g/100 g
Materia Orgánica	8,13 g/100 g
Carbono Orgánico	- -

METALES PESADOS

Cadmio	0,04 mg/Kg
Arsénico	0,02 mg/Kg
Mercurio	<0,001 mg/Kg
Plomo	<0,03 mg/Kg

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

Densidad a	1,07 g/mL a 20°C
pH	3,5
Solubilidad	100%

Fabricado por:



Inversiones Crustanic Ltda.
Nueva Dos 1285, Barrio Industrial,
Coquimbo, Chile


Comercializado por:



Agro inmobiliaria cerro grande SPA
Gerónimo méndez 1891, Barrio industrial
Coquimbo, Chile

20 lt. CONTENIDO
NETO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO



Ferti-Aminomovens

BIOESTIMULANTE DE PLANTAS / LÍQUIDO EN SOLUCIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Dosis Suelo L/ha	Forma de Aplicación
Pomáceas (Manzanos - Perales - Membrillos) Carozos (Ciruelos - Duraznos - Nectarines - Cerezos) Frutos Secos (Nogales - Almendros - Avellanos) Vides (Viníferas - Pisqueras - Mesa)	5 - 10	Dosis por semana desde inicio de brotación durante 6 a 12 semanas
Cítricos (Limones - Naranjos - Mandarinos - Clementinos) Paltos, Olivos y Granados	5 - 10	Dosis por semana desde inicio de brotación durante 6 a 12 semanas
Establecimientos de Vides y Frutales	5 - 6	Dosis por semana desde inicio de brotación durante todo el periodo de crecimiento vegetativo
Frutales menores (Arándanos - Frambuesas - Frutillas Moras - Cranberry)	5 - 10	Dosis por semana desde inicio de brotación durante 10 a 12 semanas
Hortalizas de Hoja y Tallo (Lechuga - Repollo - Acelga Apio) Hortaliza de Bulbo (Zanahoria - Betarraga - Achicoria Rabanito) Hortalizas de Flor (Coliflor - Brócoli - Alcachofas) Hortalizas de Fruto (Pepino - Tomate- Pimiento - Melon Sandía)	4 - 8	Dosis por semana, a partir de 7 días posttrasplante o post emergencia durante 6 a 10 semanas
Cultivos Anuales (Cereales en general, Oleaginosas y Leguminosas de grano, maíz), Cultivos forrajeros Complementarios (Maíz forrajero, Oleaginosas y Leguminosas forrajeras), praderas.	3	Aplicar de 1 hasta 4 aplicaciones en fase de crecimiento vegetativo y 1 a 4 aplicaciones en fase de reproductiva
Papas.	20 - 40	Aplicar establecimiento cultivo o al surco de plantación junto a los fitonitriatos (20lts/ha)

Método de preparación: Agitar bien antes de usar. En aplicaciones vía riego diluir el concentrado en agua al 5%. Utilizar agua limpia tanto en aplicaciones vía riego como foliares. **Forma de aplicación:** Ferti-AminoMovens puede ser aplicado vía riego o foliar. Evitar aplicar con temperaturas extremas. **Incompatibilidad:** Este producto es compatible con la mayoría de los fertilizantes líquidos. Sin embargo dada la gran variabilidad de formulaciones existentes, es recomendable hacer una prueba de compatibilidad antes de la aplicación. No es compatible con aceites, se recomienda no mezclar con nada a la hora de la aplicación. **Fitotoxicidad:** No es fitotóxico si es utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. **Condiciones de almacenamiento:** Mantener el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas no inferiores a 4°C y no superiores a 30°C. Evitar el congelamiento. Los envases sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. La ropa de trabajo contaminada no se debe permitir fuera del lugar de trabajo. Se recomienda la limpieza regular de los equipos, el área de trabajo y la vestimenta. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo. Usar guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Alejar los animales domésticos y personas extrañas. Lavarse prolijamente con agua limpia y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Elementos de Protección Personal: **Protección Respiratoria:** Mascarilla. **Protección de Manos:** Guantes resistentes a productos químicos. **Protección Ojos:** Gafas de seguridad. **Protección Corporal:** Overol impermeable y botas de goma. **Primeros auxilios:** En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Llamar a un médico o centro de intoxicaciones inmediatamente. **Ingestión:** NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuagar la boca con agua limpia. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar, llamar a un médico o centro de intoxicaciones. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia y jabón y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si los síntomas persisten, llamar a un médico o centro de intoxicaciones. **Inhalación:** Trasladar al afectado al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial. Llamar a un médico o un centro de intoxicaciones. **Síntomas de intoxicación:** Náuseas, calambres abdominales. **Antídoto:** No posee antídoto. **Tratamiento médico de emergencia:** Tratamiento sintomático. **Riesgos ambientales:** No posee riesgos ambientales. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. No aplicar con viento. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Teléfonos de emergencia: Inversiones Crustanic Ltda: 56 51223788. CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): 562 26353800.**

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes de dosificación, almacenaje, manejo y aplicación, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distinto a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.