X-Treem® CaB

Fertilizante Líquido Quelatado

MBFi
Leaders in Science, Partners in Growth.

FERTILZANTE LÍQUIDO QUELATADO DE CALCIO Y BORO CON AMINOÁCIDOS PARA LA APLICACIÓN FOLIAR EN LOS SIGUIENTES CUTIVOS

ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
NO EXPONER A LA LUZ SOLAR.

Composición:

Calcio* (Ca)	56.30 g/kg
Boro (B)	6.21 g/kg

*Amino Ácidos Quelatados

Metales Pesados:

Cadmio (Cd)	<0.5 mg/kg	Mercurio (Hg)	<0.5 mg/kg
Arsénico (As)	<0.5 mg/kg	Plomo (Pb)	<0.5 mg/kg

Densidad relativa (al agua 20°C)	1.28 g/ml
Solubilidad en agua	100% a 20°C
pH	7 a 20°C

Registrado/Importado y Distribuido por: MBFi Chile SPA
RUT 77470193-1 • Fecha inicio 9-11-21 • Cerro el Plomo 5680 of 301PS 3 Null • Las Condes - Chile
X-Treem es una marca registrada de MBFi Chile SPA

Fabricado, suministrado y Origen: MBFi (PTY) LTD - Sudáfrica
Reg No: 2013/211882/07 • P.O. Box 1137, Delmas, Mpumalanga, 2210
Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711 • Email: orders@mbfi.bio • Web: www.mbfi.bio

Volumen neto
20 L

CHILE 001

INSTRUCCIONES DE USO: Use solo como se indica

Usar exclusivamente como fertilizante. Agite bien antes de usar.

Guía general de aplicación:

Aplicaciones Foliares	Diluya 1:500 y aplique como una aplicación de cobertura total.
Aplicaciones al suelo	10-20 L/ha por aplicación, diluir 1:2000 y aplicar 3-6 veces durante los períodos de crecimiento.

CHILE 001

LOT: XTCBCH003/22
DOM: 2022/07/27
EXP: 2026/07/27

Detalles de mezcla y aplicación:
X-Treem CaB debe aplicarse preferentemente temprano en la mañana o al final de la tarde. La dosis de aplicación depende de la fertilidad del suelo y la reacción requerida. Las dosis más bajas deben utilizarse para el mantenimiento, mientras que las dosis más altas corregirán las deficiencias nutricionales.

Almacenamiento:
X-Treem CaB debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones libres de heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Evitar la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Este producto contiene boro. Su mal uso puede causar graves daños a los cultivos.

Cultivo	Dosis/Hectárea	Momento de aplicación
Ajo	1-3 L	Realizar en aplicaciones semanales.
Café	2-3 L	Realizar 2 aplicaciones: antes y después de que se produzca la floración.
Cereales: Avena, Cebada, Trigo	1.5-2 L	Realizar 1 aplicación antes del macollaje.
Citrus	7 L	Realizar 2 aplicaciones: antes y después de que se produzca la floración.
Cucurbitáceas	1-2 L	Aplicaciones semanales.
Flores	0.5-1.5 L	Realizar en intervalos de 15 días.
Frutales de carozo: Ciruela,Damasco, Durazno, Nectarino	2-3 L	Realizar 1 aplicación antes de la floración y luego de 8 a 10 aplicaciones a intervalos de 15 días una vez iniciada la floración.
Frutales de pepita: Manzana, Pera	2-3 L	Realizar 1 aplicación antes de la floración y luego de 8 a 10 aplicaciones a intervalos de 15 días una vez iniciada la floración.
Frutales subtropicales: Chirimoya, Lúcuma, Papaya	2-3 L	Realizar 1 aplicación antes de la floración y luego de 8 a 10 aplicaciones a intervalos de 15 días una vez iniciada la floración.
Girasol	3 L	Realizar 1 aplicación cuando el capítulo comience a abrirse.
Maní	3 L	Realizar 2 aplicaciones: antes y después de que se produzca la floración.
Papa	1-3 L	Realizar aplicaciones semanales.
Pimientos	1-2 L	Realizar aplicaciones semanales.
Porotos: Seco, Verde	3 L	Realizar 2 aplicaciones en estadios de crecimiento R5 y R7.
Soja	3 L	Realizar 1 aplicación entre las etapas de crecimiento R1 y R3.
Tabaco	2 L	Realizar 2 aplicaciones después del trasplante y volver a aplicar 30 días después de realizado el trasplante.
Tomate	1-3 L	Realizar aplicaciones semanales.
Vegetales de hoja	1-2 L	Realizar aplicaciones semanales.