X-Treem™ Mg

MBFi
Leaders in Science. Partners in Growth.

FERTILIZANTE LÍQUIDO DE MAGNESIO QUELADO CON AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR A LOS CULTIVOS ENUMERADOS.

Composición (%p/p):

Magnesio (Mg)*	3.42%

*Quelado con aminoácido

Densidad relativa (al agua 20°C)	1.225 g/ml
Solubilidad en agua	100% @ 20ºC
pH	8.34 @ 20ºC

Metales Pesados:

Cadmio (Cd)	<0.5 mg/kg	Mercurio (Hg)	<0.5 mg/kg
Arsénico (As)	<0.5 mg/kg	Plomo (Pb)	<0.5 mg/kg

Registrado/Importado y Distribuido por:
MBFi Chile SPA
RUT 77470193-1
Fecha inicio 9-11-21
Cerro el Plomo 5680 of 301PS 3 Null
Las condes - Chile

Fabricado, suministrado y Origen:
MBFi (PTY) LTD - Sudáfrica
Reg No: 2013/211882/07
P.O. Box 1137, Delmas, Mpumalanga, 2210
Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711
Email: orders@mbfi.co.za • Web: www.mbfi.co.za

X-Treem™ Mg es marca registrada de MBFi Chile SPA

Volumen neto
20 L

CHILE 001

GUÍA GENERAL DE APLICACIÓN: Utilice sólo según las instrucciones

- Uso exclusivo como fertilizante. Agite bien antes de usar.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Mantener fuera de la luz solar directa.

Cultivos extensivos:	
Aplicación foliar	Diluir 1-3 L:100 L de agua y aplicar sobre el cultivo (concentración máxima de 3% o 3 L/100 L de agua).
Aplicaciones del suelo	Aplicación de 3-10 L por hectárea.
Aplicaciones de surcos	Aplicación de 1-3 L por hectárea.
Árboles y viñedos:	
Cultivos arbóreos y vides	Diluir 0.5-2 L:100 L de agua y realizar como una aplicación de cobertura completa (concentración máxima de 2% o 2 L/100 L de agua).
Aplicaciones del suelo	5-10 L/ha por aplicación. Inyectar la dosis elegida con una dilución de 1/1000 L de agua en el sistema de fertirrigación.

Mezcla y proceso de aplicación: X-Treem™ Mg debe aplicarse preferiblemente temprano en la mañana o al final de la tarde. La dosis de aplicación depende de la fertilidad del suelo y la reacción requerida. Ante situaciones de bajo nivel de Mg foliar utilizar dosis máxima dependiendo de los requerimientos del cultivo.

Almacenamiento: X-Treem™ Mg debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones libres de heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de niños y animales. Evitar la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Cultivo	Dosis/100 L	Dosis máx/ha	Momento de aplicación
Ajo, Cebolla, Puerros	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 3-4 veces durante toda la temporada de crecimiento.
Algodón	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 2 veces durante toda la temporada de crecimiento.
Cereales: Arroz, Avena, Cebada, Trigo	1 L	2-5 L	Aplicar 2 veces durante toda la temporada de crecimiento.
Cannabis	500-1000 ml	1-5 L	Aplicar 3-4 veces a intervalos de 10-14 días.
Canola	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 2 veces durante toda la temporada de crecimiento.
Césped	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar a intervalos de 21 días comenzando temprano en la temporada de crecimiento.
Citrus: Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo	500 ml	5-10 L	Aplicar en cada “flush” de crecimiento de brotes de primavera y otoño (3 a 4 aplicaciones).
Crucíferas: Berro, Brócoli, Coles de Bruselas, Coliflor, Mostaza, Rábano, Rábano picante, Raíz de nabo, Repollo, Wasabi	500-1000 ml	2-4 L	Aplicar con 8 a 10 hojas formadas, repitiendo a los 7 a 10 días (2 aplicaciones).

Cultivo	Dosis/100 L	Dosis máx/ha	Momento de aplicación
Cucurbitáceas: Calabaza, Melón, Pepino, Sandía	500-1000 ml	2-4 L	Aplicar desde inicio de cuaje de frutos cada 7 a 10 días (3 aplicaciones).
Frutales de carozo: Cerezas, Ciruelas, Damascos, Duraznos, Lichis, Mango, Nectarinas, Paltas	500 ml	5-10 L	Aplicar desde frutos cuajados en adelante, 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Frutales de Pepita: Manzana, Pera	500 ml	5-10 L	Aplicar 60 días después de plena flor (frutos de 30 a 40 mm), 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Girasol	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 2 veces durante toda la temporada de crecimiento.
Kiwi	500 ml	5-10 L	Aplicaciones para promover crecimiento de brotes, desde 20-30 cm. de brotes hasta diciembre cada 15 días (3 a 4 aplicaciones).
Maíz	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 2 veces durante toda la temporada de crecimiento.
Nogales: Almendra, Avellanas Macadamia, Nuez, Pecanes, Pistacho	500 ml	5-10 L	Aplicar desde octubre a diciembre cada 7 a 10 días (3 a 4 aplicaciones).
Ornamental	250-500 ml	2-5 L	Aplicar cada 21-28 días.
Palto	500 ml	5-10 L	Aplicar 3-4 veces en intervalos de 14 días, comenzando en la floración.
Papas	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar desde pre - cierre de hileras, repitiendo 7 y 15 días después (3 aplicaciones).
Pimientos y Tomate	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar desde inicio de cuaje del primer racimo cada 7 a 10 días (3 aplicaciones).
Porotos: Arvejas, Garbanzos, Habas, Lentejas, Maní, Porotos secos, Soja	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 2 veces durante toda la temporada de crecimiento.
Tabaco	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 3-4 veces a intervalos de 10 días.
Uva de mesa y de vinificar	500-1000 ml	2-5 L	Aplicaciones para promover crecimiento de brotes: desde 20-30 cm. de brotes a pre-flor (3 a 4 aplicaciones). Desde cuaja a pinta (ablande) cada 7 a 15 días. En situaciones de antecedentes de “palo negro” y bajos niveles de Mg foliar utilizar dosis máxima hasta cosecha.
Vegetales de Hoja: Espinaca, Lechuga	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 15, 30 y 45 días post trasplante (3 aplicaciones).
Zanahoria	500-1000 ml	2-5 L	Aplicar 3-4 veces a intervalos de 10-14 días.