



GET Technology™

Fertilizante Líquido Soluble

FERTILIZANTE LÍQUIDO SOLUBLE QUE CONTIENE BORO, COBRE, MOLIBDENO, NITRÓGENO Y ZINC PARA LOS CULTIVOS INDICADOS.

ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
NO EXPONER A LA LUZ SOLAR.

Composición (%p/p):

Boro (B)	4.92%	Nitrogeno (N)	11.5%
Cobre* (Cu)	0.11%	Zinc (Zn)	2.57%
Molibdeno (Mo)	0.6%		

*Aminoácidos quelatados

Densidad relativa (al agua 20°C)	1.31 g/ml
Solubilidad en agua	100% @ 20°C
pH	9.86 @ 20°C

Metales Pesados:

Cadmio (Cd)	<0.5 mg/kg	Mercurio (Hg)	<0.5 mg/kg
Arsénico (As)	<0.5 mg/kg	Plomo (Pb)	<0.5 mg/kg

Registrado/Importado y Distribuido por: MBFI Chile SPA

RUT 77470193-1 • Fecha Inicio 9-11-21 • Cerro el Plomo 5680 de 301PS 3 Null • Las Condes - Chile
Bio-Finalist™ y GET™ son marcas registradas de MBFI Chile SPA.

Fabricado, suministrado y Origen: MBFI (PTY) LTD - Sudáfrica

Reg No: 2013/211882/07 • P.O. Box 1137, Delmas, Mpumalanga, 2210

Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711 • Email: orders@mbfi.bio • Web: www.mbfi.bio

Volumen neto

20 L



CHILE 001

NUTRICIÓN

IMPORTANTE:

Debido a que el boro no es móvil dentro de la planta, se requiere un suministro continuo a todos los puntos de crecimiento desde la germinación hasta la madurez. Se recomienda la aplicación suplementaria de boro cuando las pruebas de suelo muestran menos de 1.0 ppm de boro o los niveles de prueba de tejido caen por debajo de los valores promedio especificados para el cultivo. Busque el consejo de una autoridad agrícola local o del proveedor sobre las dosis de aplicación recomendadas.

Mezcla y proceso de aplicación: Bio-Finalist™ MoB debe aplicarse preferentemente temprano en la mañana o al final de la tarde. La dosis de aplicación depende de la fertilidad del suelo y la reacción requerida. Las dosis más bajas deben utilizarse para el mantenimiento, mientras que las dosis más altas corregirán las deficiencias nutricionales.

Almacenamiento: Bio-Finalist™ MoB debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones libres de heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de niños y animales. Evitar la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Cultivo	Dosis/100 L de agua	Momento de aplicación
Alfalfa	2 L	Aplicar 10 días antes del cada corte.
Canola	1-2 L	Aplicar en floración antes que aparezcan las vainas.
Cereales: Arroz, Cebada, Sorgo, Trigo	2 L	Aplicar 15 días antes que aparezcan las espigas.
Frutales de Carozo: Cerezos, Ciruelas, Duraznos, Pelones etc.	2-4 L	Empezar aplicación al 50% de floración, en cuaja de frutos y repetir a los 28 días, luego de acuerdo a requerimientos del cultivo.
Girasol	2-3 L	Aplicar a 20 cm de altura (altura de la rodilla) y en formación de la torta.
Hortalizas de bulbo: Ajo, Cebolla, Ciboullete, Puerro	2-4 L	Aplicar 3 semanas antes de la cosecha.
Legumbres: Arvejas, Garbanzo, Lentejas, Mani, Porotos on vaina, Porotos secos, Porotos	2-3 L	Aplicar en R1-R2 y aplicar entre R7 y R8.
Maíz	2-4 L	Aplicar en V4-8 y 15 días antes de la aparición de la panoja.
Nogales: Avellano, Macadamia, Nuez, Pecanes, Pistacho	2-4 L	Empezar aplicación al 50% de floración, en cuaja de frutos y repetir a los 28 días, luego de acuerdo a requerimientos del cultivo.
Papas	2-4 L	Realizar 2 y 3 semanas antes de la cosecha.
Pimiento y Tomate	2 L	Aplicar 14 días antes de la cosecha.
Remolacha azucarera	2-4 L	Aplicar antes que el cultivo empiece a senes.
Uva de mesa	2-4 L	Aplicar en bayas de 3-5 mm y repetir 28 días después.
Zanahoria	2-4 L	Aplicar 3 semanas antes de la cosecha.

AVISO: Cuando use Bio-Finalist™ MoB en su cultivo, no se debe realizar una aplicación suplementaria adicional de boro a menos que las pruebas de suelo o tejido vegetal indiquen que es necesario.