

SANMITE WP

ACARICIDA

29/02/2024

INFORMACIÓN GENERAL

INGREDIENTE ACTIVO	PIRIDABEN
GRUPO QUÍMICO	Piridazinonas
NOMBRE QUÍMICO	2-terc-butil-5-(4-terc-butilbenciltio)-4-cloropiridazin-3(2H)-ona
CONCENTRACIÓN	20% p/p (200 g/kg)
FORMULACIÓN	Polvo Mojable (WP)
MODO DE ACCIÓN	Contacto e Ingestión
FABRICANTE /FORMULADOR	Nissan Chemical Industries, Ltd. Japón.
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Summit Agro Chile SpA.
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico
AUTORIZACIÓN SAG N°	1380

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SANMITE WP, es una acaricida de contacto e ingestión, especialmente indicado para el control de los estados móviles de los ácaros (larvas, ninfas, adultos). También posee acción sobre los huevos, los cuales no llegan a eclosionar o dan origen a larvas inactivas. Su largo efecto residual permite mantener por un prolongado período los cultivos libres de arañas. **SANMITE WP**, penetra en los ácaros fitófagos por contacto e ingestión y actúa en el proceso respiratorio a nivel mitocondrial. **SANMITE WP**, posee un bajo a moderado efecto supresor de ácaros predadores con rápida recolonización de los mismos.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Plagas	Concentración/Dosis	Observaciones(*)
Vid (Vinífera, Pisquera y de Mesa).	Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>), Eriófidos de la vid (<i>Colomerus vitis</i> , <i>Calepitrimerus vitis</i>).	80 g/hL de agua (mínimo 320 g/ha para espalderas y 640 g/ha para parronal español)	Aplicar desde yema algodonosa en adelante al observar las primeras ninfas móviles en los brotes y hojas. Dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, utilizar un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento del follaje.
	Araña roja de la vid (<i>Oligonychus vitis</i>)	50 g/hL de agua (mínimo 400 g/ha en vides cultivadas en espaldera y 750 g/ha para vides en parronal español).	Para aplicaciones dirigidas al control de <i>Brevipalpus</i> spp. y Eriófidos, utilizar mojamientos entre 400 – 1.000 L de agua/ha en vides conducidas en espaldera, y entre 800 – 1.500 L de agua/ha para vides conducidas en parronal. En el caso de aplicaciones dirigidas al control de araña roja de la vid, considerar el uso de 800 – 1.000 L de agua/ha en vides conducidas en espaldera y entre 1.500 y 2.000 L de agua/ha para vides conducidas en parronal español.

Arándano, Frambuesa, Mora y Frutilla.	Araña bímaculada (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 g/hL de agua	Aplicar al inicio de la infestación, al aparecer las primeras ninfas móviles. Utilizar mojamiento de 1.000 L de agua/ha.
Paltos	Araña roja del palto (<i>Oligonychus yothersi</i>)	50 g/hL de agua (mínimo 1,25 kg/ha en huertos en producción)	Aplicar al inicio de la infestación, al aparecer las primeras ninfas móviles. Utilizar mojamiento entre 2.500 – 3.000 L de agua/ha.
Limoneros, Naranjos, Mandarinos, Clementinos, Clemenules, Pomelos.	Mosquita blanca de los cítricos (<i>Aleurothrixus floccosus</i>)	50 g/hL de agua (mínimo 1,25 kg/ha en huertos en producción)	Mosquita blanca, araña roja y falsa araña roja de la vid: Aplicar al inicio de la infestación, al observarse los primeros ejemplares móviles. Acaro de la yema de los cítricos: Aplicar a inicio de botón floral. Utilizar mojamiento entre 2.500 – 4.000 L de agua/ha.
	Araña roja (<i>Panonychus citri</i>)	75 g/hL de agua (mínimo 1,8 kg/ha en huertos en producción)	
	Acaro de la yema de los cítricos (<i>Eriophyes sheldoni</i>)	60 g/hL de agua (mínimo 1,5 kg/ha)	
	Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>)		
Manzanos, Perales.	Araña europea (<i>Panonychus ulmi</i>) Araña parda (<i>Bryobia rubrioculus</i>)	50 g/hL de agua (mínimo 1,25 kg/ha en huertos en producción)	Aplicar al inicio de la infestación, al aparecer las primeras ninfas móviles. Utilizar mojamiento de 2.500 L de agua/ha.
Durazneros, Nectarinos, Ciruelos, Cerezos, Almendros.	Araña bímaculada (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 g/hL de agua (mínimo 1,2 kg/ha en huertos en producción)	Aplicar al inicio de la infestación, al aparecer las primeras ninfas móviles. Volúmenes de agua a utilizar: En aplicaciones de frutales de carozo y almendros, considerar mojamientos de entre 1.500 – 2.500 L de agua/ha.
Nogales, Avellano europeo y Almendros		75 g/hL de agua (mínimo 1,5 kg/ha en huertos en producción)	Aplicar al inicio de la infestación, al aparecer las primeras ninfas móviles. Utilizar entre 2.000 y 3.500 L de agua/ha. En avellano europeo aplicar en receso invernal.
Frejoles, Tomates, Pimientos, Sandía, Melón, Pepino.		75 g/hL de agua	Aplicar a inicio de la infestación, al aparecer las primeras ninfas móviles. Volúmenes de agua a utilizar: En tomate industrial, frejoles, pimientos, sandía, melón y pepinos, considerar entre 400 – 800 L de agua/ha. En el caso de tomates cultivados en invernaderos, considerar mojamiento entre 400 y 1.000 L de agua/ha.
Tomate	Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	100 – 150 g/hL de agua	Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga sobre el follaje. Considerar volúmenes de agua según el desarrollo del cultivo, los que pueden ir entre 400 y 800 L/ha en tomate industrial y entre 400 y 1.000 L/ha en tomate cultivado en invernadero. Usar la más alta de las concentraciones en condiciones de alta infestación.

Kiwis	Falsa araña roja de la vid (<i>Brevipalpus chilensis</i>).	60 g/hL de agua	Aplicar desde yema algodonosa hasta botón blanco, al observar las primeras ninfas móviles en los brotes y hojas. Dependiendo del estado de desarrollo de las plantas, utilizar un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento del cultivo, considerando 800 – 1.500 L/ha.
-------	--	-----------------	---

APLICACIÓN

Sanmite® WP se debe aplicar utilizando un buen mojado y cubrimiento de los cultivos a tratar. **Sanmite® WP** en las dosis indicadas posee un buen knock-down, observándose su efecto control desde las 24 a 48 horas después de realizada la aplicación, otorgando un prolongado periodo libre de las plagas. No aplicar en contra del viento o cuando las condiciones climáticas favorezcan la deriva del producto. Se recomienda aplicar temprano en la mañana o al atardecer.

Aplicación por temporada: **Sanmite® WP**, debe ser aplicado solo una vez por temporada y no debe aplicarse en dicho periodo otro acaricida con el mismo modo de acción, como los formulados con Fenazaquin, Fenpiroximato, Tebufenpirad, ya sea solo o en mezclas.

Aplicaciones aéreas: **Sanmite® WP** está autorizado para aplicaciones aéreas en vides, paltos, nogales, cítricos y pomáceas. Considerar las mismas dosis/ha mínimas indicadas para aplicación terrestre. Utilizar volumen de aplicación entre 40 – 60 L de agua/ha. Aplicar con velocidad del viento inferior a 10 km/h.

No aplicar durante floración debido a que **SANMITE WP** es tóxico para las abejas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Coloque agua en el estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **Sanmite® WP** en un poco de agua, hasta formar una pasta. Vierta esta mezcla al estanque aplicador. Luego complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Para favorecer el cubrimiento de la aplicación, **Sanmite® WP** puede ser aplicado en mezcla con coadyuvantes organosiliconados. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad o consultar a nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo con las Buenas Prácticas Agrícolas y las Instrucciones de esta etiqueta.

PERÍODO DE CARENIA

Manzanos y perales: 10 días. Almendros, nogales, pimiento, melón, sandía, frejoles y frutillas: 7 días. Limoneros, naranjos, mandarinos, clementinos, clemenules, pomelos, paltos, vides: 15 días. Durazneros, nectarinos, ciruelos, cerezos: 21 días. Arándanos, frambuesos, zarzamora: 19 días. Kiwis: 90 días. Tomates, pepinos: 6 días. Avellano europeo: por la fecha de aplicación, no corresponde establecer un período de carencia.

TIEMPO DE REINGRESO

No hay restricciones una vez completamente secado el depósito sobre la superficie aplicada. Sin embargo, se recomienda una espera de 2 horas previa verificación del completo secado del depósito aplicado. Para animales, no corresponde indicar un tiempo de reingreso ya que los cultivos indicados no se destinan a uso animal en pastoreo.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía ya sea expresa o implícita de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones del producto al cual estas se refieren. **LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MISMO.**