

MaXsil®

Silicato Líquido Complejo

FERTILIZANTE DE SILICATO DE POTASIO LÍQUIDO COMPLEJADO PARA FERTILIZACION FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN EN CULTIVOS INDICADOS.

ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
NO EXPONER A LA LUZ SOLAR.

Composición (%p/p):

Nitrogeno (N)	9.5%
Potasio (K ₂ O)	7.45%

Densidad relativa (al agua 20°C)	1.23 g/ml
Solubilidad en agua	100% @ 20°C
pH	14 @ 20°C

Metales Pesados:

Cadmio (Cd)	<0.5 mg/kg	Mercurio (Hg)	<0.5 mg/kg
Arsénico (As)	<0.5 mg/kg	Plomo (Pb)	<0.5 mg/kg

Volumen neto

20 L



Registrado/Importado y Distribuido por:

MBFi Chile SPA • RUT 77470193-1
Fecha inicio 9-11-21
Cerro el Plomo 5680 of 301PS 3 Null
Las Condes - Chile

Fabricado, suministrado y Origen:

MBFi (PTY) LTD - Sudáfrica • Reg No: 2013/211882/07
P.O. Box 1137, Delmas, Mpumalanga, 2210
Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711
Email: orders@mbfi.bio • Web: www.mbfi.bio

Maxsil® es una marca registrada de MBFi Chile SPA

CHILE 001

PRODUCTIVIDAD

Cultivos extensivos:	
Aplicaciones foliares	Diluir 200 ml/100 L de agua y aplicar al cultivo (máximo de 2 L por hectárea en caudales elevados de agua).
Aplicaciones al suelo	Aplicar de 2.5-10 L/ha.
Arboles y viñedos:	
Aplicación foliar	Diluir 0.25 L/100 L de agua y aplicar como una aplicación de cobertura total (concentración máxima de 5 L/ha en grandes volúmenes de agua).
Aplicación al suelo	5-10 L/ha por aplicación, diluir 1:1000 y aplicar 3-6 veces durante los períodos de crecimiento.

Detalles de mezcla y aplicación: Maxsil® debe aplicarse preferentemente temprano en la mañana o al final de la tarde. Las dosis de uso dependen de la fertilidad del suelo y la reacción requerida. Las dosis más bajas deben utilizarse para el mantenimiento, mientras que las dosis más altas corregirán las deficiencias nutricionales. Realice todas las aplicaciones de manera foliar o al suelo. Cuando lo agregue a la mezcla del tanque de pulverizado, no regule el pH por debajo de 7. Maxsil® es un silicato complejo y se puede mezclar con nutrientes como Ca y Mg, pero limite el tiempo de mezcla. Si es posible, aplicar por separado en 2 aplicaciones diferentes al cultivo.

Almacenamiento: Maxsil® debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones libres de heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de niños y animales. Evitar la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Cultivo	Dosis/100 L de agua	Momento de aplicación
Almácigos	3 ml/10 L	Aplicar semanalmente como mojando los plantines con el riego.
Bayas: Arándano, Frutilla, Frambuesa, Todos los demás	200 ml	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14 días.
Cebolla	250 ml	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14 días.
Cereales: Arroz, Cebada, Raps, Sorgo, Trigo	200 ml	Realice la primera aplicación en etapa de pleno macollaje, repita en la hoja bandera.
Césped	200 ml	Realizar aplicaciones cada 14 días.
Citrus: Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo	250 ml (Max 5 L/ha)	Realice de 4 a 6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días, comenzando a principios de la primavera (Septiembre).
Crucíferas: Berro, Brócoli, Coles de Bruselas, Coliflor, Mostaza, Rábano, Rábano picante, Raíz de nabo, Repollo, Wasabi	200 ml	Aplicar en el estadio de 4-6 hojas, repetir cada 14 días.
Cucurbitáceas: Calabaza, Melón, Pepino, Sandía	200 ml	Aplicar en el estadio de 4-6 hojas, repetir cada 14 días.
Frambuesa/Frutillas	200 ml	Realice de 4 a 6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14 días.
Frutales de Carozo: Cerezos, Ciruelos, Damascos, Duraznos, Nectarines, Pelones	250 ml (Max 5 L/ha)	Realice de 4 a 6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días desde el comienzo de la floración.
Frutales de Pepita: Manzana, Pera	250 ml (Max 5 L/ha)	Realice de 4 a 6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días a partir del comienzo de la primavera (Septiembre).

Cultivo	Dosis/100 L de agua	Momento de aplicación
Girasol	250 ml	Realizar la primera aplicación a 20 cm de altura de la planta, repetir durante la floración.
Maíz	200 ml (Max 400 ml/ha)	Realice la primera aplicación en V4 y repita en la etapa de crecimiento V8.
Kiwi	200 ml	Realizar 4-6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con 14-28 días de diferencia.
Lechuga	200 ml	Realizar la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14 días.
Maní	250 ml	Aplicar en el estadio de 4-6 hojas, repetir cada 14 días.
Nogales: Avellano, Macadamia, Nuez, Pecanes, Pistacho	250 ml (Max 5 L/ha)	Realice de 4 a 6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días a partir del comienzo de la primavera (Septiembre).
Olivo	250 ml	Realice de 4 a 6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días a partir del comienzo de la primavera (Septiembre).
Ornamental	200 ml	Aplicar cada 14 días.
Palto	250 ml (Max 5 L/ha)	Realizar de 4 a 6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14-28 días, comenzando a principios de la primavera (Septiembre).
Papas	250 ml	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14 días.
Pimiento y Tomate	250 ml	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14 días.
Porotos	200 ml	Realice la primera aplicación en la etapa de 4-8 hojas, repita durante la floración.
Tabaco	200 ml	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 21 días.
Viñedos (uva de mesa o de vinificar)	250 ml (Max 5 L/ha)	Realizar de 4 a 6 aplicaciones durante la temporada de crecimiento con un intervalo de 14 días, comenzando a principios de la primavera (Septiembre/Octubre).
Zanahoria	200 ml	Realice la primera aplicación a las 4-6 hojas, repetir cada 14 días.