

SBF

Sistema de Defensa de Cultivos

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO PARA SUMINISTRAR POTASIO Y FÓSFORO.

ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
NO EXPONER A LA LUZ SOLAR.

Composición (%p/p):

Fosforo (P_2O_5)	20.46%
Potasio (K_2O)	22.95%
Acido Salicílico	0.01%
(Equivalente a 555 g/L de Fosfito de Potasio y equivalente a 350 g/L de ácido fosforoso)	

Densidad relativa (al agua 20°C)	1.33 g/ml
Solubilidad en agua	100% @ 20°C
pH	6.3 @ 20°C

Metales Pesados:

Cadmio (Cd)	<0.5 mg/kg	Mercurio (Hg)	<0.5 mg/kg
Arsénico (As)	<0.5 mg/kg	Plomo (Pb)	<0.5 mg/kg

Volumen neto

20 L



Leaders in Science. Partners in Growth.

Registrado/Importado y Distribuido por:

MBFi Chile SPA • RUT 77470193-1
Fecha inicio 9-11-21
Cerro el Plomo 5680 of 301PS 3 Null
Las Condes - Chile

Fabricado, suministrado y Origen:

MBFi (PTY) LTD - Sudáfrica • Reg No: 2013/211882/07
P.O. Box 1137, Delmas, Mpumalanga, 2210
Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711
Email: orders@mbfi.bio • Web: www.mbfi.bio

CHILE 001

PRODUCTIVIDAD

GUÍA GENERAL DE APLICACIÓN: Utilice sólo según las instrucciones

- Uso exclusivo como fertilizante. Agite bien antes de usar.

CHILE 001

SBF debe aplicarse preferentemente temprano en la mañana o al final de la tarde. La dosis de aplicación depende de la fertilidad del suelo y la reacción requerida. Las dosis más bajas deben utilizarse para el mantenimiento, mientras que las dosis más altas corregirán las deficiencias nutricionales.

- Período de carencia o retención: Período mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha del cultivo para alimentos o piensos:

Cítricos y patata: 14 días

Uvas de mesa y vino: 28 días

- Intervalo de reingreso: No ingrese al área tratada hasta que el depósito de rociado se haya secado a menos que use ropa protectora.

Almacenamiento: SBF debe almacenarse fuera de la luz solar directa y en un lugar seco y fresco en condiciones libres de heladas. Mantenga el producto bajo llave y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Evitar la contaminación de alimentos o fuentes de agua.

Cultivo	Dosis/ha	Dosis/100 L de agua	Momento de aplicación
Bayas: Arándanos, Frambuesa, Frutilla, Mora	2-4 L	200-300 ml	Aplicar 2 veces por cada periodo de crecimiento o durante el ciclo completo del cultivo.
Café	1.5-2 L	200-500 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Cereales: Arroz, Avena, Cebada, Lupino, Sorgo, Trigo, Raps	1-2 L	1-2 L	1 ^{ra} aplicación: 25 días después de emergencia. 2 ^{da} aplicación: 40 días después de emergencia.
Cítricos: Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Pomelo	3-5 L	200-300 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Fruta de pepita: Manzana, Membrillo, Pera	3-5 L	200-300 ml	Aplicar 45, 30 y 15 días antes de la cosecha.
Frutales de Carozo: Almendro, Cereza, Ciruela, Damasco, Durazno, Nectarin	3-5 L	200-300 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Hortalizas de bulbo: Ajo, Cebolla, Ciboulette, Puerro	1-3 L	400-500 ml	Aplicar en vivero a partir de 2 hojas verdaderas, trasplantar y repetir cada 7-10 días.
Kiwi	3-5 L	200-300 ml	Aplicar con brotes de 20-30 cm y repetir a los 12-15 días.
Legumbres: Arvejas, Garbanzo, Lentejas, Mani, Porotos en vaina, Porotos secos, Porotos	1-2 L	1-2 L	1 ^{ra} aplicación: V5 (estadio de crecimiento). 2 ^{da} aplicación: R1 (estadio de crecimiento).
Maíz	1-2 L	400-500 ml	Desde 3-4 hojas.
Mango	2-5 L	250-500 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Melon	1-3 L	400-500 ml	Aplicar en vivero a partir de 2 hojas verdaderas, trasplantar y repetir cada 7-10 días.
Nogales: Avellano, Macadamia, Nuez, Pecanes, Pistacho	3-4 L	125-150 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Palto	6-10 L	200-300 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Papa	3-4 L	300-500 ml	Desde plantas con 30 cm de altura.
Pimiento y Tomate	1-5 L	250-500 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Piña	1-5 L	250-500 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.

Cultivo	Dosis/ha	Dosis/100 L de agua	Momento de aplicación
Pomáceas	3-5 L	200-300 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Rosas	1-5 L	250-500 ml	Realizar 4-6 aplicaciones anuales.
Sandía	1-3 L	400-500 ml	Aplicar en vivero a partir de 2 hojas verdaderas, trasplantar y repetir cada 7-10 días.
Soja	1-2 L	1-2 L	1 st aplicación: V5 (estadio de crecimiento). 2 nd aplicación: R1 (estadio de crecimiento).
Uva de mesa y vinífera	3-5 L	200-300 ml	Aplicar con brotes de 20-30 cm y repetir a los 12-15 días.
Verduras de hoja: Acelga, Achicoria, Berro, Brotes de proto mungo, Espinacas, Lechuga	1-3 L	400-500 ml	Aplicar en vivero a partir de 2 hojas verdaderas, trasplantar y repetir cada 7-10 días.
Zanahoria	1-3 L	400-500 ml	Aplicar en vivero a partir de 2 hojas verdaderas, trasplantar y repetir cada 7-10 días.

Pomáceas

3-5 L

200-300 ml

Realizar 4-6 aplicaciones anuales.